

Ringer: Jan de Jong, Joure. Aanwezig van 3:55 uur tot 11:20 uur.

Assistent: Fokke Stastra, Oldeouwer. Vangtijd; van 4:20 tot 10:50 uur (6:30 uur).

### 1. Algemeen beeld vanmorgen.

Vanmorgen bij aankomst eerst dichte laaghangende mistflarden die pas rond 08.00 uur optrokken. In de eerste uren hingen er in diverse netten waterdruppels. Weinig wind en niet koud. Het zou een drukke ochtend worden met veel vogels en een leuke verrassing.

### Weersomstandigheden.

Wind: ZO 1B, later in de morgen draaiend naar O en toenemend tot 2B, Temperatuur: 9 tot 18 °C, Bewolking: van 2/8 naar 8/8 wisselend, pas na 08.00 uur zon Zicht: eerste uren grondmist daarna helder. Zonsopkomst: 6:05 uur Vegetatie en terrein: Ringpad nat. Het Riet komt al zeker 60 cm boven de waterspiegel uit. De groene vegetatie komt nu meer en meer door. Veel Penningkruid langs looppaden.

### 2. Veldwaarnemingen.

Koekoek zeker 2 vogels in de vroege ochtend roepend, later overvliegend; Sprinkhaanzanger 2 vogels zingend in vroege ochtend; Blauwborst 1 zingend bij slootje; Merel zingend bij net C7; Rietgors op terrein zeker 3 zingende mannetjes; Meerkoet 2 paar op Tjeukemeer langs oever; Rietzanger op zeker 2 plekken zingend op ringplek; Goudvink 1 vogel al roepend overvliegend naar O; Boerenzwaluw 3 keer 1 vogel overvliegend naar W; Zwarte kraai 1 vogel ten W van net 1; Visdief zeker een zestal al krijsend rondvliegend, enkele vissend in kanaal langs polderdijk; Knobbelzwaan rond 9.00 uur grote groep van zeker 29 overvliegend vanuit O naar W, later nog eens 5 naar NO; Zanglijster 1 zingend ten O van slootje Grauwe gans regelmatig enkele groepjes overvliegend; Wilde eend diverse paren op Tjeukemeer, zeker een 15 tal vogels gezien; Aalscholver op palenrij een vijftal rustend; Kokmeeuw diverse vogels overvliegend; Grutto roepend boven grasland Miekeveene; Tureluur diverse vogels regelmatig gehoord. Verder waargenomen; Rups van Wilgehoutvlinder verdronken in emmertje. Vlinders; 1 x Dagpauwoog, 2 x Klein geaderd witje en 1 x Bont zandoogje.

Opmerkelijk was een vroege Viervlek libel die we op de oevervegetatie aantroffen. Van de libel maakte ik kort achter elkaar diverse fotos en daarbij viel iets opmerkelijks op. Foto links is genomen om 9:31.36 uur en foto rechts is genomen om 9.32.34 uur. De foto's verschillen qua tijd dus nog geen minuut toch zie je een opvallend verschil in kleur.



Foto's 30-4-2012.© Jan de Jong, Joure. Viervlek aan oever Tjeukemeer te Rohel.

Bij de linker foto zien we duidelijk dat het lijf (rugschilden S1-S5) erg donker zijn en in de foto rechts zijn deze (nog geen minuut later) opvallend licht bruin van kleur. Deze kleurverandering bij deze soort was me nog niet eerder opgevallen. In de Nederlandse Libellen (2002) blz.20 staat vermeldt dat bij Watersnuffels, glazenmakers, en heidelibellen een donker oppervlak juist zonne-energie absorbeert, sommige soorten kunnen, waarschijnlijk gestuurd door temperatuur, deze absorptie regelen door donkere en lichte pigmenten in de huidcellen te verplaatsen. Mogelijk dat een en ander ook te maken kan hebben met een bepaalde signaalfunctie, veel libellen zijn namelijk visueel ingesteld.

### 3. Ringvangsten.

Vogelsoort	R	T	ET	1kj	C	N	Opmerkingen
<b>Bonte vliegenvanger</b>					1	1	<b>Met Stavanger ring!</b>
<b>Braamsluiper</b>	1					1	
<b>Fitis</b>	19		5			24	<b>Nog div. doortrekkers</b>
<b>Grasmus</b>	3					3	
<b>Kleine karekiet</b>	2					2	<b>Eerste twee dit jaar</b>
<b>Merel</b>		1				1	
<b>Pimpelmees</b>	1	1				2	<b>Vrouw met broedvlek</b>
<b>Rietzanger</b>	3					3	
<b>Spotvogel</b>	1					1	<b>Eerste dit jaar</b>
<b>Sprinkhaanzanger</b>	1					1	
<b>Tjiftjaf</b>	5	1	3			9	
<b>Tuinfluitier</b>		1				1	<b>2-7-2011 1kj op ringplek</b>
<b>Winterkoning</b>			1			1	
<b>Witsterblauwborst</b>	1					1	<b>mannelijke</b>
<b>Zwartkop</b>	13		1			14	<b>Veel doortrek</b>
<b>Totaal 15 soorten</b>	<b>50</b>	<b>4</b>	<b>10</b>		<b>1</b>	<b>65</b>	

R = nieuw geringd. T = terugvangst eigen ring van voorgaande ja(a)ren. ET = eigen terugvangst van zelfde ringjaar. Dat geldt ook voor vogels die voor de 2<sup>e</sup> keer in dit jaar worden teruggevangen. 1kj = het aantal gevangen eerste kalenderjaar vogels. C = controle vangst van andere ringer(s). N = totaal gevangen

#### Opmerkingen bij ringvangsten.

Vanmorgen duidelijk trek langs de oever nadat de grondmist was opgetrokken. Vooral Fitis en Zwartkop passeerden in grotere aantallen. Enkele Zwartkoppen hadden vetscores van 1 tot 3, een woog zelfs 21.4 gram. Opmerkelijk was de vangst van een Bonte Vliegenvanger met een pootring uit Noorwegen (Stavanger Norway). De Bonte vliegenvanger is een soort die we eigenlijk maar zelden vangen en ringen op de ringplek van Rohel. Dit exemplaar was duidelijk meer zwart/wit getekend dan de bij ons in Friesland broedende soort.

Ook een eerste Tuinfluitier was al terug, de vogel hadden we zelf op 2 juli 2011 als 1 jaars op de ringplek geringd. De Rietgors was wel aanwezig vanmorgen doch vloog maar weinig, kennelijk zitten de wijfjes nog op de eieren. Had Een paar Pimpelmees liet zich bij net 3-4 vangen, het wijfje duidelijk al een gerimpelde broedvlek wat er op duidt dat er jongen zijn. Mogelijk is het paar afkomstig uit de directe omgeving.



Foto 30-4-2012.© Jan de Jong, Joure.  
Bonte vliegenvanger mannetje met Noorse ring gevangen in Rohel aan het Tjeukemeer.